



**ATENÇÃO PARA A NOVA APRESENTAÇÃO DO FOSFATO DE OSELTAMIVIR
SUSPENSÃO ORAL, MANIPULADO A PARTIR DO SAL**

Informamos que está sendo distribuída uma nova apresentação do **FOSFATO DE OSELTAMIVIR SUSPENSÃO ORAL**, manipulado a partir do sal- **15mg/ml**- substituindo a apresentação anterior de 12mg/ml.

DOSAGEM RECOMENDADA DE **FOSFATO DE OSELTAMIVIR MANIPULADO a partir do sal - 15mg/ml**, frasco com 50 ml:

- CRIANÇAS acima de um ano de idade e menores de 12 anos, com menos de 40 kg: as doses variam de acordo com o peso, conforme tabela abaixo, 2 vezes ao dia, por 5 dias.

| | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|
| Menos de 15 kg | 30 mg (2ml) | Duas vezes ao dia |
| De 15 a 23 kg | 45 mg (3ml) | Duas vezes ao dia |
| De 23 a 40 kg | 60 mg (4ml) | Duas vezes ao dia |
| Acima de 40 kg | 75 mg (5ml ou 1 cáp.) | Duas vezes ao dia |

- CRIANÇAS menores de um ano, a dosagem deve ser de acordo com a idade, conforme tabela abaixo, 2 vezes ao dia, por 5 dias.

| | | |
|--------------|---------------|--|
| < 3 meses | 12 mg (0,8ml) | Duas vezes ao dia. Não recomendado exceto se situação considerada crítica |
| 3 – 5 meses | 20 mg (1,3ml) | Duas vezes ao dia |
| 6 – 11 meses | 25 mg (1,6ml) | Duas vezes ao dia |

Algumas informações pertinentes sobre o FOSFATO DE OSELTAMIVIR:

- Não é esperado que ele possa alterar o efeito de nenhum outro medicamento;
- É recomendado tomá-lo com alimentação para diminuir a chance de náuseas ou vômitos;
- Pode também ser tomado com bebidas não alcoólicas ou água;
- Seu sabor amargo pode ser disfarçado com alimento ou com uma bebida doce logo após;
- Os eventos adversos como náuseas, vômitos e dor de estômago ocorrem principalmente após a 1ª dose e, em geral, cessam com a continuação do tratamento;
- Para os pacientes que vomitam até uma hora após a ingestão pode ser administrada uma dose adicional.